

УТВЕРЖДЕНО  
Приказ Министерства  
здравоохранения Украины  
19.05.14 № 340  
Регистрационное удостоверение  
№UA/0964/01/01

ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ  
Наказ Міністерства охорони  
здоров`я України  
№

**ИНСТРУКЦИЯ**  
для медицинского применения лекарственного средства  
**ВИНИЛИН<sup>®</sup>**  
(Бальзам Шостаковского)

**Состав:**

*действующее вещество:* эфир поливинилбутиловый.

1 г Винилина<sup>®</sup> (Бальзама Шостаковского) содержит 1 г эфира поливинилбутилового.

**Лекарственная форма.** Жидкость накожная.

*Основные физико-химические свойства:* густая, вязкая жидкость от светло-желтого до коричневатого-желтого цвета со специфическим запахом. На воздухе не густеет и не высыхает. Легко растворим в пропаноле и толуоле, практически нерастворимый в воде и спирте этиловом 96%. Смешивается во всех соотношениях с этиловым эфиром, хлороформом, маслами и жидким парафином.

**Фармакотерапевтическая группа.**

Средство для лечения ран и язвенных поражений.

Код АТХ D03A X.

**Фармакологические свойства.**

**Фармакодинамика.**

Винилин<sup>®</sup> (Бальзам Шостаковского) обладает противомикробным действием, способствует очищению ран, регенерации и эпителизации тканей.

**Фармакокинетика.**

Антисептическое действие обусловлено способностью препарата дегидратировать микробные клетки, вызывая коагуляцию белка и гибель микробных клеток. В результате восстановления происходит замещение очагов некроза специфической и/или соединительной (имеет самый высокий потенциал регенерации) тканью.

**Клинические характеристики.**

**Показания.**

При фурункулах, карбункулах, трофических язвах, гнойных ранах, маститах, ранениях мягких тканей, ожогах, обморожениях, дерматитах и воспалительных заболеваниях кожи.

**Противопоказания.**

Индивидуальная повышенная чувствительность организма к препарату.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.**



Не описано.

**Особенности применения.**

Можно применять в виде 20 % масляного раствора, в том числе в сочетании с другими совместимыми с Винилином® лекарственными средствами (мазями на вазелиновой и других основах, пастами и кремами).

**Применение в период беременности или кормления грудью.**

Информация о применении препарата в период беременности и кормления грудью отсутствует, применение препарата не рекомендуется.

**Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.**

Отсутствуют данные об отрицательном влиянии препарата на способность управлять автотранспортом и обслуживать движущиеся механические приспособления.

**Способ применения и дозы.**

Применять для смачивания салфеток и непосредственного нанесения на пораженную поверхность, в чистом виде или в виде 20 % раствора в персиковом или других растительных маслах, или в мазях. Частота применения – 3-5 раз в сутки.

Курс лечения определяется врачом индивидуально.

**Дети.**

Информация о применении препарата детям отсутствует, применение препарата не рекомендуется.

**Передозировка.**

Симптомы передозировки не описаны.

**Побочные реакции.**

Очень редко – индивидуальная повышенная чувствительность к препарату: возможны аллергические реакции, в основном местного характера.

**Срок годности.**

5 лет.

**Условия хранения.**

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Упаковка.**

По 50 г в банках или по 100 г в банках или флаконах.

**Категория отпуска.**

Без рецепта.

**Производитель.**

ПАО «Витамины».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.**

Украина, 20300, Черкасская обл., г. Умань, ул. Ленинской Искры, 31.

**Дата последнего пересмотра.**

