

АПІМІЛК®

Бджолине маткове молочко



Склад:

1 таблетка містить апілаку ліофілізованого (бджолиного маткового молочка) 9,5 мг $\pm 10\%$;
допоміжні речовини: лактози моногідрат, крохмаль картопляний, тальк, кальцію стеарат.

Форма випуску. Таблетки сублінгвальні.

АПІМІЛК® не містить глютену, барвників, консервантів та ароматизаторів.

Рекомендації щодо споживання:

- сприяє нормалізації функції лактації та збільшенню об'єму грудного молока у жінок в післяпологовий період
- може бути рекомендовано як додаткове джерело амінокислот, вітамінів, макро- та мікроелементів
- сприяє підвищенню опірності організму у дорослих та дітей при недостатньому харчуванні, гіпотрофії та відсутності апетиту

Спосіб вживання.

МЕТА СПОЖИВАННЯ	ВІК	ДОЗУВАННЯ ТА КРАТНІСТЬ ПРИЙОМУ
Підвищення лактації	Дорослі	По 1 таблетці 3 рази на день
Підвищення лактації в період лактаційних кризів	Дорослі	По 1 таблетці 4 рази на день до відновлення нормальної лактації
Підвищення опірності організму, при недостатньому харчуванні, гіпотрофії та при відсутності апетиту	Дорослі та підлітки	По 1 таблетці 3 рази на день
	Діти старше 6 років	По 1 таблетці 2 рази на день

ТРИВАЛІСТЬ КУРСУ СПОЖИВАННЯ — 15 ДНІВ.

Особливості застосування.

Таблетку слід покласти під язик (сублінгвально) і тримати до повного розчинення, оскільки при прийомі препарату внутрішньо шлунковий сік розщеплює бджолине маткове молочко.

Протипоказання.

Вагітність, підвищена чутливість до продуктів бджільництва та інших допоміжних речовин, що входять до складу добавки, хвороба Аддісона.

Застереження.

Не перевищувати рекомендовану денну кількість. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Дієтична добавка містить лактозу, тому споживачам зі спадковими формами непереносимості галактози, дефіцитом лактази або мальабсорбцією глюкози-галактози не слід її застосовувати.

Перед вживанням проконсультуйтеся з лікарем.

Умови зберігання. Зберігати в сухому, захищеному від світла місці, при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Строк придатності: 2 роки.

Дата виготовлення: дивись на упаковці.

Упаковка. По 10 таблеток у блістері; по 3 або 6 блістерів у пачці з картону.

Виробник. ПАТ «Вітаміни».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Ленінської Іскри, 31.
Тел. (04744) 4-67-60

Не є лікарським засобом.

Без ГМО.

Відповідає ТУ У 10.8-00480968-003:2017

АПІМІЛК® — дієтична добавка, що містить у своєму складі бджолине маткове молочко природного походження, яке виробляється алотрофічними залозами робочих бджіл.

Склад бджолиного маткового молочка:

17 амінокислот	15 жирних кислот	Вітаміни	Мінеральні компоненти та мікроелементи
Аргінін, цистеїн, гістидин, лізин, валін, лейцин, ізолейцин, треонін, серин, метіонін, трипто- фан та інші	10-оксидеценова, транс-10-окси-3- деценова, бурш- тинова, адипіно- ва, пімелінова, коркова, ліурино- ва та інші	Вітамін С, В ₁ , В ₂ , В ₅ , В ₆ , В ₈ , В ₁₂ , Н, кислота фолієва, інозитол, біотин та інші	К, Na, Ca, Mn, Cu, Fe, P, Co, Zn, Si, S, Ni, Cr, As та інші

- активує та стимулює роботу лактоцитів — клітин, які продукують молоко в молочних залозах жінок у післяпологовий період. Таким чином АПІМІЛК® сприяє збільшенню об'єму грудного молока та підвищенню лактації
- має загальнотонізуючу та антиспастичну дію
- підвищує опірність організму та стійкість до стресів
- сприяє нормалізації обміну речовин

